

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

漢方の小柴胡湯エキス顆粒剤

カ湧仙

第2類医薬品

『カ湧仙の特長』

カ湧仙は、漢方治療の古典の一つである「傷寒論」に記載されている本来は煎じて服用する小柴胡湯をエキス化して、服みやすく、はやく吸収されて効果が出るように顆粒剤にしたものです。

カ湧仙は「風邪を引いた後、熱がなかなか抜けなくて胸脇が重苦しい」「吐気がする」「食欲がない」「ふだん胃が弱い」「何となく疲労感がある」などの症状に服用してください。



■ 相談すること



使用上の注意

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (1) 医師の治療を受けている人。 | (6) 次の症状のある人。 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 | むくみ |
| (3) 体の虚弱な人。 (体力の衰えている人、体の弱い人)。 | (7) 次の診断を受けた人。 肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病 |
| (4) 高齢者。 | (8) インターフェロン製剤で治療を受けている人。 |
| (5) 今までに薬により発疹、発赤、かゆみ等 を起こしたことがある人。 | |

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書をもって医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|---------------|
| 皮 膚 | 発疹、発赤、かゆみ |
| そ の 他 | 頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------|---|
| 間質性肺炎 | せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 |
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する。顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。 |

(2) 1ヵ月位(風邪の後期に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合。

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

効能・効果

体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症；

食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

用法・用量、成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

用法・用量

次の量を食前又は食後に、温湯又は水にて服用してください。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|----------|--------|
| 大 人 | 1包(2.5g) | 3回 |
| 15才未満～7才以上 | 2/3量 | |
| 7才未満～4才以上 | 1/2量 | |
| 4才未満～2才以上 | 1/3量 | |
| 2才未満 | 服用しないこと | |

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

3包(成人の1日服用量)中

| 成 分 | 分 量 | |
|--------|------|----------------------------|
| サイコ | 6.0g | 水製エキス 2.7g (小柴胡湯エキス) |
| ハンゲ | 5.0g | |
| ショウキョウ | 1.0g | |
| オウゴン | 3.0g | |
| タイソウ | 3.0g | |
| ニンジン | 3.0g | |
| カンゾウ | 2.0g | |

添加物としてデンプンを含有します。

〔注 意〕

本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがあります、効果に変わりありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用する場合には、残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室
0120-432-894 (フリーダイヤル)
[月～金曜日/10:00～17:00まで(祝祭日を除く)]

製造販売元: 株式会社 **和漢薬研究所**

〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山1193

発 売 元: **カポニー産業株式会社**

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-8 (日本公衆衛生協会ビル)