

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ボレイ末を主薬としたカルシウム製剤

新 ササカル

第3類医薬品

『新ササカールの特長』

カルシウムは私たちの骨や歯をつくっている重要な構成成分です。また、そればかりではなく血液にとけ込んで全身に運ばれ、筋肉の働きや神経機能の調節、更に全ての細胞の働きに重要な役目を果たしています。成人の場合、カルシウムの一日必要摂取量は約600mgとされています。新ササカールはボレイ末とグルコン酸カルシウムに乳酸カルシウムを加えて一日量で約600mgのカルシウムが摂れるようにしてあります。ボレイ末は、昔から良質なカルシウム源として利用されているばかりでなく、漢方薬原料の古典である「神農本草経」にも収載されている昔から重要な原料の一つでもあります。グルコン酸カルシウムと乳酸カルシウムは胃液の中での溶解性が高く吸収の良いカルシウムです。また、新ササカールはカルシウムの補給と栄養・吸収のバランスを考えてビタミンB群とカルシウムの吸収を良くするビタミンDの前駆体であるエルゴステリンや多種類のアミノ酸を豊富に含有している乾燥酵母を配合してあります。

成長期のお子さんから若い女性、或いは妊産婦の方、そしてお年寄りまで、ストレス社会に生きるすべての方を対象とした大変にのみやすい吸収のすぐれたカルシウム剤です。



虚弱体質



育ち盛り



妊婦・授乳期



中高年

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書をもって医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、便秘等の症状があらわれた場合。
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

効能・効果

- a) 次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質、腺病質。
(腺病質とは、貧血などになりやすい虚弱・無力体質を指します。)
- b) 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止。

用法・用量、成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

用法・用量

次の量を食間に温湯又は水にて服用してください。
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	5錠	3 回
15才未満 7才以上	3錠	
7才未満 5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

15錠(成人の1日服用量)中

成 分	分 量	はたらき
ボレイ末	1,500mg (カルシウムとして470mg)	体内へカルシウム補給
グルコン酸カルシウム水和物	800mg (カルシウムとして70mg)	体内へカルシウム補給
乳酸カルシウム水和物	500mg (カルシウムとして60mg)	体内へカルシウム補給
乾燥酵母	300mg	ビタミンB群やアミノ酸等の栄養補給とカルシウムの吸収を高める。

添加物としてデンプン、乳糖水和物、銅クロロフィリンNa、ステアリン酸Mg、香料を含有します。

(注 意)

本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 容器の中に乾燥剤が入っておりますので、誤って服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室
0120-432-894 (フリーダイヤル)
[月～金曜日/10:00～17:00まで(祝祭日を除く)]

製造販売元: 株式会社 **和漢薬研究所**

〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山1193

発 売 元: **カポニー産業株式会社**

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-8 (日本公衆衛生協会ビル)